

CARACTÉRISTIQUES

BET est un produit spécialement conçu pour agir comme protecteur anti-stress environnemental. Bet est une combinaison d'osmoprotecteurs (glycinebétaine et acide aminé), qui agit en synergie.

BET se déplace rapidement vers tous les organes sensibles de la plante (fruits, racines et jeunes feuilles) agissant comme préventif et protecteur contre le stress environnemental. BET est recommandé tout au long de la phase de croissance végétative et de reproduction.

BET AJUSTE L'ÉQUILIBRE OSMOTIQUE À L'INTÉRIEUR DES CELLULES ET DES TISSUS VÉGÉTAUX.

- POUDRE VÉGÉTALE MOUILLABLE
- ORIGINE NATURELLE
- EFFET ANTI-FISSURATION
- ACTIF TROIS SEMAINES
- PRÉCOCITÉ ET HOMOGÉNÉITÉ DE LA COULEUR DES FRUITS
- ADAPTÉ À UNE LARGE GAMME DE CULTURES
- FROID, CHALEUR, SÉCHERESSE, SALINITÉ



SALINITÉ



CHALEUR



FROID



SÉCHERESSE

COMPOSITION

	%p/p
Glycine bétaine (Glybet)	80,0
Acides aminés libres	6,0
L-Proline (Pro)	6,0





RENDEMENT
ET QUALITÉ



SYSTÉMIQUE

DOSAGE ET APPLICATION

CULTURE	OBJECTIF	DOSAGE	TEMP D' APPLICATION	MÉTHODE
 Coton	Augmente la production.	3 kg/ha (200-500 L d'eau)	7-15 jours à partir du début de la floraison.	Pulvérisation foliaire unique.
 Arbres fruitiers : agrumes, pommier, poirier	Réduit les fissures, améliore la couleur des fruits, augmente les rendements.	5 - 7 Kg/Ha	Au stade de floraison précoce à complète. 4 semaines avant la récolte.	10-20L d'eau/arbre.
 Vigne	Prévenir les fissures et améliorer la durée de conservation.	Premier traitement : 4 kg/ha Deuxième traitement : 2-4 kg/ha	Environ 4 semaines avant la récolte, lorsque les grappes sont presque complètement développées. Environ 2 semaines avant la récolte, lorsque la couleur des raisins commence à changer.	Quantité d'eau 400-100L/ha.
	Augmentation de la croissance et du rendement dans des conditions défavorables et amélioration de la qualité du rendement.	2 - 3 Kg/Ha	Application au plus tard 24h avant les conditions de stress. Répéter toutes les 3 semaines.	Quantité d'eau : 400-1000L/ha Application par irrigation goutte à goutte possible dans un substrat de laine de roche.
 Tomate de serre, concombre et poivron	Amélioration de la tolérance aux agressions et de la vitalité des plantules.	6 g/L	Application au plus tard 24h avant les conditions de stress. Répéter toutes les 3 semaines.	Quantité d'eau : 400-1000L/ha
 Olivier	Augmente les rendements.	3 - 5 Kg/Ha 10-20L d'eau/arbre)	Au début de la floraison. 4 semaines avant la récolte.	Appliquer en complément des traitements anti-projections

Compatibilité : peut être pulvérisé en association avec des produits phytosanitaires et des engrais foliaires, à l'exception des formulations contenant du cuivre ; Utilisation d'adjuvant mouillant à l'exception des formulations contenant du cuivre ; concentration maximale de la solution de pulvérisation : 30 g/L.

CULTURE	OBJECTIF	DOSAGE	TEMPS D' APPLICATION	MÉTHODE
 Pomme de terre	Augmente la tolérance au froid.	2Kg/Ha	Au début de l'initiation du tube.	200-400 L/Ha
 Cultures de fraises, de framboises et d'autres baies (en plein champ et sous tunnel)	Prévenir les dégâts causés par le gel. Améliorer la croissance lors de conditions de croissance impropres Améliorer la durée de conservation et prévenir les fissures.	2 - 4 Kg/Ha	At flowering stage, 24 hours before low temperatures. 24 hours before stress conditions. Start the treatment at the ripening stage and repeat every 2-3 weeks.	Water amount: 400-100 L/Ha
 Open field Tomato		2 Kg/Ha (200-500L d'eau)	Transformation de la tomate : au début ou au milieu de la floraison. Tomate de table : 10 jours après le début de la floraison.	Répétez 1 à 2 fois à intervalles de 3 semaines.
 Légumes et herbes aromatiques de plein champ	Améliorer la tolérance au stress et les semis.	6 g/L	Au plus tard 24 heures avant les conditions de stress. Répéter toutes les 3 semaines si nécessaire.	Pulvérisation foliaire : pulvériser les plantules uniformément humides.
	Améliorer la tolérance au stress après la plantation.	2-4 Kg/Ha		Pulvérisation foliaire : humidifier uniformément les plantes. Quantité d'eau : 400-1000 L/Ha
	Légumes-feuilles de plein champ	2 Kg/Ha		

Compatibilité : peut être pulvérisé en association avec des produits phytosanitaires et des engrais foliaires, à l'exception des formulations contenant du cuivre ; Utilisation d'adjuvant mouillant à l'exception des formulations contenant du cuivre ; concentration maximale de la solution à pulvériser : 30 g/L.

EMBALLAGE :

