

NOUVEAU
IMPORTÉ
D'ESPAGNE

STYM 35



ACIDES AMINÉS



AVEC
I.S.I.
INITIATEUR DU SYSTÈME
IMMUNOLOGIQUE

COMPOSITION

%p/v

Acides aminés libres	35,00
Azote total (N)	6,80
Densité : 1,26g/cc	
pH: 7	

STYM 35 est un bioactivateur naturel à base d'acides aminés obtenus par des procédés enzymatiques, ce qui rend le **STYM 35** plus efficace que les produits issus de procédés chimiques. Il est recommandé pour toutes les cultures et à tout moment, en particulier lorsque les plantes ont besoin de plus de nutriments comme lors de la pré-floraison, de la nouaison, du gonflement des fruits, de la croissance végétative, des conditions salines ou climatiques, etc. Aspe a développé un groupe de molécules que nous appelons **I.S.I.** capables d'agir comme activateurs de résistance aux maladies.

	SOIL DOSAGE	Lts/ha
FRAISES	Tous les 10 jours après le repiquage.	4
ARBRES FRUITIERS	Du bourgeonnement jusqu'au gonflement du fruit.	6
PLANTES DE BANANA	Tous les 15 jours entre mars et juin.	6
OLIVIERS	Tout au long du cycle.	18
RAISINS DE TABLE	Du bourgeonnement jusqu'à la fin du cycle.	5
FRUITS SECS	Du bourgeonnement jusqu'au gonflement du fruit.	5
AGRUMES	De la floraison jusqu'au gonflement du fruit.	12
COTON	10 jours après la pousse jusqu'à 20 jours après la floraison.	6
ORNEMENTALES	Tous les 15 jours après le repiquage.	4

	FOLIAR DOSAGE	cc/100L
CULTURES HORTICOLES	Tous les 10 jours après le repiquage.	200
FRAISES	Tout au long du cycle.	200
TUBERCULES	Tous les 15 jours.	250
ARBRES FRUITIERS	Du bourgeonnement jusqu'au gonflement du fruit.	200 - 300
PLANTES DE BANANA	Tous les 15 jours.	250
OLIVIERS	Tout au long du cycle.	200 - 300
RAISINS DE TABLE	Du bourgeonnement jusqu'à la fin du cycle.	250
RAISINS DE VIN	Du bourgeonnement jusqu'à la fin du cycle.	2L / Ha
FRUITS SECS	Du bourgeonnement jusqu'au gonflement du fruit.	200 - 300
AGRUMES	De la floraison jusqu'au gonflement du fruit.	200 - 300
BETTERAVE	2 applications tous les 15 jours.	2,5 L / Ha
COTON	10 jours après la germination jusqu'à 20 jours après la première fleur.	300
LUZERNE	Après chaque tonte.	2,5 L / Ha
ORNEMENTALES	Tous les 15 jours après le repiquage.	250
PELOUSE	Après semis / Phase de croissance.	3-5 L / Ha / 30 cc / m²

AUGMENTE :



RENDEMENT



NUTRITIF
ADOPTION




RACINE
SYSTÈME



LA GRAINE
GERMINATION



IMMUNOLOGIQUE
ACTION DU SYSTÈME
DES RÉCOLTES



L'application foliaire de **STYM 35** peut augmenter la disponibilité des acides aminés et des peptides pour l'absorption par les plantes en réduisant la compétition avec les micro-organismes du sol.

EMBALLAGE :



Aspe



IMPORTÉ
DE L'UE