



CARACTÉRISTIQUES

Le COBALT est bénéfique pour :

La nodulation et la fixation biologique de l'azote chez les légumineuses, car il est indispensable à la vitamine B₁₂ des bactéries symbiotiques.

Une meilleure assimilation et un meilleur métabolisme de l'azote.

Le maintien de la chlorophylle, de la photosynthèse et de la croissance en cas de carence.

Une meilleure tolérance à certains stress environnementaux.

COMPOSITION

%p/p

Cobalt total (Co) 5,0
Agent complexant : acide gluconique

APPLICATION



APPLICATION FOLIAIRE

- Appliquer sur une culture en pleine activité végétative et disposant d'une surface foliaire suffisante.
- Utiliser de préférence entre 200 et 400 L d'eau/ha pour les grandes cultures.
- Pour la vigne, les arbres fruitiers et les cultures à fort développement végétatif, adapter le volume entre 400 et 1 000 L/ha.
- Appliquer de préférence tôt le matin ou en fin d'après-midi.
- Éviter les traitements lorsque les températures dépassent 25–28 °C, en cas de fort rayonnement solaire, de gel, de vent ou lorsque les plantes sont soumises à un stress hydrique important.
- Ne pas appliquer sur les fleurs ouvertes des cultures sensibles sans avoir effectué un essai préalable.
- Assurer un mouillage uniforme sans atteindre le point de ruissellement.

APPLICATION AU SOL OU EN FERTIGATION

- Diluer préalablement le produit dans l'eau.
- Injecter pendant le tiers central du cycle d'irrigation.
- Terminer avec de l'eau claire afin de rincer l'installation.
- En application localisée, répartir uniformément le produit dans la zone des racines actives.
- Dans les sols très acides, sableux ou naturellement riches en métaux, n'utiliser le produit qu'après une analyse préalable.
- Ne pas appliquer directement au contact des semences, des racines nues ou du matériel de multiplication.



CULTURE	APPLICATION FOLIAIRE	APPLICATION AU SOL	PÉRIODE RECOMMANDÉE
Pois, fève, soja, luzerne et trèfle	0,10 - 0,20 L/ha	0,25 - 0,40 L/ha	Stade 3 à 6 feuilles ; deuxième application avant la floraison si nécessaire
Blé	0,05 - 0,10 L/ha	0,10 - 0,20 L/ha	Du tallage au début de la montaison
Orge et avoine	0,05 - 0,10 L/ha	0,10 - 0,20 L/ha	Du tallage jusqu'au premier nœud

CULTURE	APPLICATION FOLIAIRE	APPLICATION AU SOL	PÉRIODE RECOMMANDÉE
Maïs grain et fourrage	0,05 - 0,10 L/ha	0,10 - 0,20 L/ha	V4 - V8
Tournesol	0,05 - 0,10 L/ha	0,10 - 0,20 L/ha	Stade 4-8 feuilles
Betterave à sucre	0,05 - 0,10 L/ha	0,10 - 0,25 L/ha	Stade 4-8 feuilles ou avant la fermeture des rangs
Pomme de terre	0,05 - 0,10 L/ha	0,10 - 0,20 L/ha	Début du développement végétatif ; avant la fermeture des rangs

Compatibilité

Éviter le mélange direct avec :

- des produits fortement alcalins ;
- des solutions présentant des niveaux de pH extrêmes ;

- des solutions de phosphates hautement concentrées ;
- des produits contenant de fortes concentrations de carbonates ou de bicarbonates.

! Agiter avant utilisation

EMBALLAGE :



ENGRAIS
CE
IMPORTÉ DE
LA UE