

NOUVEAU
IMPORTÉ
D'ESPAGNE

GLUCCO P



Engrais liquide au phosphore
chélaté avec acide gluconique

CARACTÉRISTIQUES

- Engrais phosphaté à assimilation rapide.
- Phosphore stabilisé et protégé contre les blocages du sol.
- Haute solubilité et compatibilité avec d'autres engrais.
- Adapté à l'application racinaire et foliaire.
- Faible risque de précipitation dans les systèmes de fertigation.

AVANTAGES DU PHOSPHORE CHÉLATÉ À L'ACIDE GLUCONIQUE

L'acide gluconique agit comme un agent chélatant organique hautement efficace, apportant les avantages suivants :

- Maintient le phosphore disponible et mobile dans le sol.
- Évite la fixation du phosphore par le calcium, le fer ou l'aluminium.
- Améliore l'absorption même dans les sols à pH élevé.
- Stimule l'activité microbienne du sol.
- Favorise une absorption racinaire progressive et durable.
- Réduit les pertes dues à l'insolubilisation.

COMPOSITION

%p/v

Phosphore (P_2O_5) 40,0
Agent chélatant - Acide gluconique
Densité : 1,32



APPLICATION



CULTURE	DOSAGE	TEMPS	BÉNÉFICES
Maïs	Sol : 3 à 6 L/ha par application. Foliaire : 200–300 ml/hl	Semis et premières phases végétatives (V2–V6).	Stimule le développement racinaire, améliore la levée et la vigueur initiale.
Céréales (blé, orge, riz)	Sol : 3–5 L/ha Foliaire : 200–300 ml/hl	Début du tallage.	Meilleur enracinement et meilleure valorisation de l'azote.
Cultures maraîchères (tomate, poivron, laitue, brocoli)	Sol : 2–4 L/ha Foliaire : 200–300 ml/hl	Après transplantation et en préfloraison.	Démarrage rapide et floraison uniforme.
Arbres fruitiers et agrumes	Sol : 4–6 L/ha Foliaire : 200–300 ml/hl	Débourrement et préfloraison.	Améliore la nouaison et la vigueur végétative.
Légumineuses (soja, haricot, pois)	Sol : 3–5 L/ha Foliaire : 200–300 ml/hl	----	Favorise la nodulation et l'efficacité photosynthétique.

Bénéfices et fonctions du phosphore dans la plante

Le phosphore est un nutriment essentiel impliqué dans des processus clés :

- Énergie cellulaire (ATP).
- Développement et ramification du système racinaire.
- Stimulation de la croissance initiale de la culture.
- Floraison et nouaison des fruits.
- Uniformité et précocité de la récolte.
- Amélioration du transport des sucres et des nutriments.

Son utilisation est particulièrement importante aux stades précoces de la culture et lors des périodes de forte demande énergétique.

Compatibilité et recommandations

- Compatible avec la majorité des engrais et micronutriments.
- Éviter les mélanges avec des produits fortement alcalins.
- Il est recommandé d'effectuer un test de compatibilité préalable.
- Appliquer de préférence aux heures de moindre stress thermique.

Stockage

- Conserver dans l'emballage d'origine, fermé et protégé du soleil.
- Température idéale : 5–30 °C.
- Ne pas stocker avec des produits fortement alcalins.

! SECQUEZ-LE AVANT UTILISATION

EMBALLAGE :



ENGRAIS
CE
IMPORTÉ
DE L'UE