

NOUVEAU
IMPORTÉ
D'ESPAGNE

GLUCCO Mo



CORRECTEUR DE
MOLYBDÈNE BIO COMPLEXÉ

CARACTÉRISTIQUES

GlucCo Mo est une formulation de Molybdène avec de l'acide gluconique qui donne de la stabilité au produit dans des conditions extrêmes.

GlucCo Mo facilite l'absorption et libère le Molybdène dans le système sol-plante.

MOLYBDENUM – ROLE OF NUTRIENT

OPTIMISE LA CROISSANCE DES PLANTES

AIDES À LA FORMULATION DE NODULES DE LÉGUMINEUSES.

CONVERTIT LE NITRATÉ (NO₃) EN ACIDES AMINÉS ET EN PROTÉINES DANS LA PLANTE

IMPLIQUÉ DANS LA SYNTHÈSE DE L'ABA.

CONVERTIT LES NITRATES EN ACIDES AMINÉS ET EN PROTÉINES DANS LA PLANTE.

INDISPENSABLE AU PROCESSUS DE FIXATION SYMBIOTIQUE DE L'AZOTE PAR LES BACTÉRIES RHIZOBIA DANS LES CULTURES DE LÉGUMINEUSES.



OPTIMISER LA CROISSANCE DES PLANTES

IMPLIQUÉ DANS LA SYNTHÈSE DE L'ABA

Conséquences d'une carence en molybdène :

- Réduction du limbe foliaire chez les légumineuses.
- Chlorose des bords et des feuilles entières.
- Nécrose.
- Perturbation de la formation des têtes de chou-fleur et de brocoli,
- Les feuilles de chou-fleur deviennent lancéolées et les jeunes feuilles sont réduites ("whiptail").
- Mauvaise utilisation de l'azote, accumulation excessive de nitrates dans les légumes
- Liaison limitée de l'azote atmosphérique.
- Mauvaises résistance aux maladies.

APPLICATION FOLIAIRE

COMPOSITION

%p/v

Molybdène (Mo)

6,0

Densité : 1,2

Agent chélateur naturel (acide hepta-gluconique)



PRÉCAUTION:

Nocif en cas d'ingestion. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Provoque une irritation des yeux. Éviter le brouillard de pulvérisation. Bien se laver les mains après utilisation. En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux avec de l'eau pendant au moins 10 minutes et consulter un médecin.

STOCKAGE ET ÉLIMINATION:

Ne pas contaminer l'eau, les pieds ou les aliments lors du stockage ou de l'élimination. Conserver dans un endroit frais, sec et verrouillé hors de portée des enfants. Vérifier la compatibilité avec les mélanges chimiques et les hautes teneurs en phosphate et solutions alcalines (pH élevé).

Culture	Objectif / Problème	Recommandation	Temps
Toutes les cultures	Pour la nutrition en molybdène, l'efficacité de l'azote, le rendement, le taux de photosynthèse.	0,25 L / ha (en tant que fertilisation foliaire si nécessaire dans au moins 200L d'eau. Lors de l'application avec un pulvérisateur à dos 0,1 %).	Si nécessaire
Légumes généraux	Rendement, amélioration de la nodulation, efficacité N, vitalité.	1 à 2 fois 0,25 L/ha	Une fois qu'une masse foliaire suffisante s'est développée.
Légumineuses	Amélioration de la nodulation, efficacité N, vitalité.	1 à 2 fois 0,25 L/ha	A partir du stade 6 feuilles.
Plantes médicinales, plantes à parfum et plantes à épices.	Rendement, amélioration de la nodulation, efficacité N, vitalité.	1 à 2 fois 0,25 L/ha	Une fois qu'une masse foliaire suffisante s'est développée.
Colza	Pour prévenir les symptômes du "whiptail", vitalité, efficacité du N.	1 à 2 fois 0,25 L/ha	Pendant la période de végétation.
Pâturage	Rendement, amélioration de la nodulation, efficacité N, vitalité.	2-3 times 0,25 L/ha	Pendant la période de végétation.
Betterave à sucre	Pour prévenir les symptômes de caillage déformé et de whiptail, vitalité, efficacité de l'azote.	1 à 2 fois 0,25 L/ha	A partir du stade 6 feuilles.
Tournesols	Efficacité N, vitalité.	1 à 2 fois 0,25 L/ha	A partir du stade 4 feuilles.

EMBALLAGE :



ENGRAIS
CE
IMPORTÉ
DE L'UE