



CARACTÉRISTIQUES

GLUCCO ZnB est un produit développé pour prévenir et corriger les carences en Bore et Zinc dans toutes les cultures. La complexation de ces nutriments par la molécule d'acide gluconique améliore l'absorption et le transport de ces nutriments dans les cultures.

Glucco ZnB est un produit recommandé pour le contrôle préventif et le traitement des états dans lesquels il existe des carences en Mn et Zn.

Complexe ZN et B par composé organique gluconique.

Source efficace de Zn et B.

ZINC

- Formation d'hormones de croissance
- Formation des graines et des grains
- Favorise la maturité
- Hauteur de la plante
- Synthèse des protéines
- Transformation et consommation de glucides

BORE

- Synthèse des protéines
- Formation d'hormones végétales
- Favorise la maturité
- Augmentation de la floraison
- Affecte le métabolisme de l'azote et des glucides
- Relation eau dans la plante

DOSAGE ET APPLICATION

Culture	Dosage	Applications d'objectifs
Pommes, poires, abricots, pêches, cerises	2-3L/ha	Appliquer à 30% de floraison et à nouveau après la récolte en automne. Ne pas dépasser un taux d'application de 0,1 (100 ml/100 l d'eau). Appliquer en pulvérisation complète avant et après la floraison ainsi qu'après la récolte.
Olives	1-2L/ha	
Agrumes	25-50ml /tree 2-4L/ha	Appliquer dans un minimum de 3 000 L d'eau/ha en pulvérisation à couverture complète. Appliquer à raison d'un maximum de 4 kg/ha. Ne pas appliquer plus d'une fois par an sur les jeunes arbres.
Coton	1-2L/ha	Appliquer dès le premier carré, dès les premières fleurs et dès la formation des capsules.
Crucifères (laitue, betterave, céleri)	1-2L/ha	Appliquer en pulvérisation à couverture complète et répéter toutes les 3 semaines au besoin.
Fleurs et plantes ornementales	1-2L	Appliquer à intervalles de 4 semaines selon les besoins.
Figues	1L	Appliquer en pulvérisation à couverture complète après le débourrement, mais avant la mise en culture de la breba. Répéter l'application après la récolte de la culture principale.
Lucerne	1-2L/ha	Appliquer en pulvérisation à couverture complète 10 fois après chaque coupe.
Maïs	5-15L/ha 1-3L/ha	Appliquer uniformément sur la surface du sol avant la plantation. Appliquer en pulvérisation à couverture complète et répéter au besoin.
Oignons	1-2L/ha	Appliquer au stade crayon, au stade bulbe et 14 jours après le bulbe.
Pomme de terre	1-3L/ha	Appliquer en pulvérisation à couverture complète et répéter à intervalles de 3 à 4 semaines selon les besoins.
Fraises	1-3L/ha	Appliquer une fois avant la floraison.
Betterave à sucre	2-3L/ha	Appliquer au stade 8 à 10 feuilles et répéter au besoin.
Tournesol	5-15L/ha 1-3L/ha	Appliquer uniformément sur la surface du sol avant la plantation, appliquer en pulvérisation complète et répéter au besoin.
Tomates	1-2L/ha	Appliquer en pulvérisation à couverture complète et répéter au besoin.
Raisins de vin et de table	1-2L/ha	Appliquer juste avant la floraison puis à nouveau directement après la récolte. Ne pas dépasser un taux d'application de 0,1% (100 grammes/100 l d'eau).
Les légumes en général	2-4L/ha 200-300cc/100ml	Correction nutritionnelle. De la germination à l'après-récolte.

ATTENTION : ZONNEBOR LIQUIDE : Peut être compatible avec de nombreux produits chimiques agricoles. Il est conseillé de faire un test de miscibilité avant de mélanger avec d'autres produits chimiques. ZONNEBOR LIQUIDE : Doit être appliqué de préférence tôt le matin ou en fin d'après-midi. Ne pas appliquer sur des plantes qui subissent une période d'humidité ou

COMPOSITION

%p/v

Zinc (Zn)	6,50
Bore(B)	4,00
Densité : 1,37	



EMBALLAGE :



ENGRAIS
CE
IMPORTÉ
DE L'UE