

CUC LIGNO



CORRECTEUR DE CARENCE EN CUIVRE À
ACTION FONGISTATIQUE ET BACTÉRIOSTATIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- **Correcteur de cuivre** : apporte du cuivre complexé hautement disponible au niveau foliaire et racinaire, corrigeant ainsi les carences et optimisant les enzymes clés (lignification, photosynthèse, respiration).
- **Action préventive** : le cuivre disponible en surface assure une activité fongistatique et bactériostatique (protection par contact) lors de pulvérisations préventives contre divers oomycètes et bactéries.
- **Mouillage rapide et bonne couverture** grâce à la nature lignosulfonate.
- **Convient aux programmes intégrés** en agriculture professionnelle (conventionnelle et biologique, sous réserve d'homologation/d'étiquetage local).
- **Phytotoxicité inférieure** à celle des sels de cuivre non complexés (lorsqu'utilisé aux doses et aux moments recommandés).
- **Miscible avec la plupart des nutriments et adjuvants** ; convient aux programmes à faibles résidus.
- **Favorise la santé des tissus et l'assainissement** des plaies après la taille et les dommages mécaniques (usage préventif).

COMPOSITION

%p/v

Cuivre (Cu) 7,6
Agent chélateur naturel
(acide lignosulfonique)



APPLICATION FOLIAIRE

Culture	Objectif	Temps	Taux (L/ha)	Intervalle
Blé	Tache septorienne (Zymoseptoria tritici)	Préventif au tallage (BBCH 25–29) ; répéter au début de l'élongation de la tige (BBCH 31–32)	1.0–1.6	7–10 days
Orge	Tache réticulée (Pyrenophora teres)	Préventif du tallage à l'allongement précoce de la tige (BBCH 25–32)	1.2–1.8	7–10 days
Avoine	Tache des feuilles (Drechslera/Pyrenophora spp.)	Préventif au tallage ; répéter avant la feuille étendard (BBCH 25–29, puis 31–32/37)	1.0–1.6	7–10 days
Seigle	Complexe de taches foliaires (Drechslera/Rhynchosporium spp.)	Préventif au tallage et à l'allongement précoce de la tige (BBCH 25–32)	1.0–1.6	7–10 days
Tomate/Poivron (GH ou de plein champ)	Tomate/Poivron (GH ou de plein champ)	Début des périodes fraîches et humides ; après la taille/le palissage	1.0–1.8	7–10 days
Concombre/-Cucurbitacées	Tache angulaire des feuilles (P. s. pv. lachrymans)	Préventif après la transplantation et pendant les périodes d'humidité des feuilles	1.2–2.0	7–10 days
Oignon/Allium	Mildiou (Peronospora destructor)	Préventif en période de risque.	1.5–2.0	7–10 days
Fraise/Baies	Tache angulaire des feuilles (Xanthomonas fragariae)	Préventif après élagage/pluies	0.9–1.2	7–10 days
Pomme/Poire	Feu bactérien (Erwinia amylovora)	Avant le débourrement et après la récolte ; éviter la pleine floraison.	1.5–2.3	10–14 days
Pomme de terre	Mildiou (P. infestans)	Début de la fermeture des rangs et avant les périodes d'infection.	1.5–2.0	7–10 days



APPLICATION AU SOL / IRRIGATION FERTILISANTE (correction des carences)

Objectif :	Dose saisonnière :	Temps :	Remarques :
Correction de la carence en Cu confirmée par analyse.	• Carence légère : 2–3 kg/ha (unique ou fractionné). • Carence modérée : 5–6 kg/ha. • Carence sévère : 10–11 kg/ha.	En fertilisation de base, en début de croissance végétative ou en division par fertirrigation.	Eviter le blocage à pH élevé ; accompagner de matière organique et d'un bon drainage lorsque cela est possible.



Compatibilité et mélange en cuve

- Ne pas mélanger avec des produits fortement alcalins, des bouillons très alcalins, des phosphates/phosphites concentrés ou des huiles minérales dans le même réservoir sans test préalable.
- pH de pulvérisation recommandé : 5,5–6,5.
- Dans les arbres fruitiers sensibles, éviter les mélanges avec des produits pouvant provoquer un roussissement à des stades critiques (chute des pointes vertes/des grappes/des pétales).

EMBALLAGE :



! Bien agiter avant utilisation



WWW.ASPEAGRO.COM

ENGRAIS

CE
IMPORTÉ
DE L'UE