

Color K



ENGRAIS POTASSIQUE



COMPOSITION

%p/v

Potassium (K_2O)	50,0
Azote (N)	3,0
EDTA	1,0
Densité : 1,45 - 1,50 @ 18°C	
pH: 7 - 8	

COLOR K est une formulation concentrée contenant du potassium et de l'azote. La présence d'EDTA augmente l'efficacité en améliorant la disponibilité du potassium dans la plante au moment où elle en a le plus besoin. **RECOMMANDÉ POUR TOUS LES TYPES DE CULTURES.**

COLOR K aide la plante à créer un environnement foliaire peu propice aux agents pathogènes foliaires tels que l'oïdium et le botrytis.

LA CONCENTRATION DES SUCRES

LE POIDS MOYEN DES FRUITS

LA TAILLE DES FRUITS

LA PRODUCTION



CULTURES	ÉTAT	DOSAGE
Agrumes:	Appliquer lorsque les fruits sont en phase de nouaison, de gonflement et avant la récolte.	 DOSAGE FOLIAIRE : 200-500 cc / 100 Lts DOSAGE DE FERTIRRIGATION : 10-30 Lts / Ha tous les 15 jours. 
Coton:	2 à 4 traitements durant le cycle de vie de la culture.	
Arbres fruitiers:	Appliquer lorsque les fruits sont en phase de nouaison, de gonflement et avant la récolte.	
Raisins:	Appliquer lorsque les fruits gonflent, mûrissent et prennent de la couleur.	
Cultures horticoles:	2 à 6 applications tout au long du cycle végétatif des cultures.	
Oliviers:	Appliquer lorsque les fruits sont en phase de nouaison, de gonflement et avant la récolte.	
Fraises:	1 à 3 traitements pendant la floraison, la fructification et la formation des tubercules.	
Betterave à sucre:	A partir de 2 mois avant la récolte.	
Fruits tropicaux:	2 à 4 traitements durant le cycle de vie de la culture.	

DILUTION : Le taux d'arrosage recommandé est de 500 à 1500 litres par hectare. Agiter toujours le récipient avant ouverture.

EMBALLAGE :



ENGRAIS
CE
IMPORTÉ
DE L'UE