

SOLDENSO 12+05+42+Te

Red Gel



ENGRAIS SOLUBLE

CARACTÉRISTIQUES

SOLDENSO est un produit nutritionnel formulé et non un simple mélange de matières premières, comme le sont la plupart des engrais NPK sous forme de poudre.

SOLDENSO présente une solubilité uniforme et simultanée de tous les nutriments, pendant l'utilisation, tout en évitant la sédimentation dans les récipients de stockage de la solution nutritive. En revanche, les engrais en poudre solubles dans l'eau NPK courants, qui sont produits à partir d'un mélange de matières premières, présentent une variabilité accrue de la taille des grains, ce qui entraîne une dilution non uniforme des nutriments, puisque les grains les plus petits sont dissous en premier. La conductivité et la salinité. L'indice est maintenu à des niveaux très bas afin que le sol ne soit pas brûlé par une concentration indésirable de sel. L'application est adaptée à différentes cultures : arbres fruitiers, caféiers, oliviers, cultures maraîchères, cultures industrielles, prairies, etc. en irrigation goutte à goutte, application foliaire et irrigation par inondation.

pH neutre, contrairement à la plupart des feuilles liquides qui sont très acides ou très alcalines. **SOLDENSO** peut être utilisé à des doses plus élevées, sans être agressif envers les cellules qui forment les stomies.

Il est plus confortable pour l'agriculteur de doser en volume plutôt qu'en poids.

Meilleure solution en termes de rapidité et de facilité d'utilisation. Permet une plus grande homogénéité de dispersion liquide que les produits solides.

Garantit la solubilité par sa formulation GEL.

Adjuvant : favorise l'efficacité des produits phytopharmaceutiques lorsqu'ils sont appliqués conjointement

COMPOSITION

%p/v

Azote total (N)	12,00
Oxyde de phosphore (P_2O_5)	05,00
Oxyde de potassium (K_2O)	42,00
Bore (B)	0,016
Agent chélateur du fer (Fe) EDTA	0,047
Agent chélateur du cuivre (Cu) EDTA	0,016
Agent chélateur Manganèse (Mn) EDTA	0,016
Agent chélateur du zinc (Zn) EDTA	0,016
Molybdène (Mo)	0,016



APPLICATIONS

CULTURES	SOL (L/ha)	FOLIAIRE (mL/100L)	DÉTAILS DE LA DEMANDE
Céréales	3-5	350	En cas de carence en potassium, répétez tous les 10 à 14 jours si nécessaire.
Agrumes	1	100	1 application à la nouaison.
	2-3	200-300	1 application après la nouaison.
	3	300	1 application en été.
	3	300	1 candidature en septembre-octobre.
Paprika	2-3	200	1ère application 3 semaines après le repiquage, suivre d'une 2ème application 14 jours plus tard.
Roses et plantes ornementales	2-3	200-300	Applications mensuelles sur plantes vivaces. 2 applications à 14 jours d'intervalle sur les annuelles lors des premiers stades de croissance.
Fruits à noyau (foliaire)	3	300	1 Application à la chute des pétales.
	2	200	1 Application en début de nouaison.
	2-3	200-300	1 Application un mois avant la récolte.
Fraises	3	300	Application unique 3 semaines après la plantation.
Tomates et poivrons	3-4	300-400	1ère application 3 semaines après le repiquage, suivie d'une 2ème application 14 jours plus tard.
Légumes	3-4	300-400	1 à 2 applications au début de la période de croissance de la culture.
Autres cultures	3	300	Pour les cultures présentant des carences en phosphate, répéter à intervalles de 10 à 14 jours selon les besoins.

SOLDENSO peut être combiné avec presque tous les engrais et pesticides. En cas de doute, nous recommandons un essai ou consultons notre service technique.

EMBALLAGE :



WWW.ASPEAGRO.COM

ENGRAIS



IMPORTÉ
DE L'UE