

BORZINC



CORRECTEUR DE BORE ET DE ZINC

CARACTÉRISTIQUES

BORZINC est un engrais liquide qui apporte un très bon rapport de Bore et de Zinc, qui, appliqué à une dose adéquate et aux moments phénologiques propices, augmente les niveaux de ces nutriments de manière efficace. Grâce à sa formulation spécifique, **BORZINC** est particulièrement recommandé pour une application en préfloraison et en nouaison de toutes les cultures.

Le bore (B) est présent principalement dans les solutions du sol sous forme d'anion BO_3^{3-} , la forme généralement absorbée par les plantes. L'un des micronutriments les plus importants affectant la stabilité des membranes, le bore soutient l'intégrité structurelle et fonctionnelle des membranes cellulaires végétales. Les symptômes de carence en bore apparaissent d'abord au niveau des points de croissance, et certains types de sol sont plus sujets aux carences en bore.

B

Influences sur la fécondation et la nouaison

Activité méristématique et croissance

Synthèse des protéines

Migration du sucre

Utilisation des auxines par les plantes

Fonction enzymatique

Synthèse de l'hormone de croissance

Synthèse des protéines

Zn

Le zinc (Zn) est absorbé par les plantes sous forme de cation bivalent Zn^{2+} . Il a été l'un des premiers micronutriments reconnus comme essentiels pour les plantes et celui qui limite le plus souvent les rendements. Bien que le Zn ne soit nécessaire qu'en petites quantités, des rendements élevés sont impossibles sans lui.

DOSES ET APPLICATION

Cultures	Foliaire	Application et intervalle
Fruit à pipe de pierre	1-2 L/Ha	Effectuer 1 à 2 applications au débourrement des bourgeons et effectuer 1 à 2 applications en nouaison.
Vigne et olivier	1-2 L/Ha	Effectuer 1 à 2 applications en préfloraison et faire 1 à 2 applications en nouaison.
Agrumes	1-2 L/Ha	Effectuer 1 à 2 applications au stade du gonflement des bourgeons.
Baies	1-2 L/Ha	Effectuer 1 à 2 applications en mode bouton floral.
Tournesol, colza, soja, céréales	2-3 L/Ha	Effectuer l'application avec une masse foliaire suffisante développée.
Maïs	2-3 L/Ha	Effectuer l'application avec une masse foliaire suffisamment développée.
Pomme de terre	2-3 L/Ha	Effectuer les applications à 15 cm de hauteur et en état de tubérisation.
Horticulturales	2-3 L/Ha	Après la récolte et avant la chute des feuilles, une masse foliaire toujours suffisante s'est développée.
Cultures ligneuses	3-4 L/Ha	APRÈS RÉCOLTE : Après la récolte et avant la chute des feuilles, toujours avec des feuilles vertes actives.
Application goutte à goutte générale :		3-5 L/Ha Distribué en 2-3 applications selon les besoins de la culture.

Cautions

En cultures ligneuses et horticoles, il est déconseillé de dépasser la concentration de 0,2% (2L pour 1000L d'eau) ; sauf en applications post-récolte. En extensif, il est déconseillé de dépasser la concentration de 1% (1L pour 1000L d'eau). En cas de mélange avec d'autres produits, un test de compatibilité avec de petites quantités de produits est toujours nécessaire. Ne pas appliquer pendant la floraison ni lors du changement de couleur des fruits.

COMPOSITION

%p/v

Bore (B)	11,5
Zinc (Zn)	4,0

Agent chélateur :
EDTA (acide éthylènediaminetétraacétique)



Améliore la floraison

Augmente la croissance végétative

Spécialement formulé pour les arbres fruitiers sensibles aux carences en Bore et Zinc

EMBALLAGE :



ENGRAIS
CE
IMPORTÉ
DE L'UE