

STYM ROOT



SYSTÈME RACINAIRE BIOSTIMULANT




COMPOSITION

	%p/v
Azote total (N)	4,00
Phosphore (P₂O₅)	9,25
Potassium (K₂O)	12,00
Matière Organique	24,00
Zinc (Zn)	0,65
Fer (Fe)	0,65
Molybdène (Mo)	0,25
GABA	1,30
Acide indolacétique	0,50
Densité : 1,32	

STYM ROOT est un engraisseur et biostimulant naturel spécialement développé et formulé avec des acides aminés libres et codifiables, enrichis en NPK et en microéléments essentiels chélatés d'assimilation rapide, indiqué pour stimuler et favoriser le développement du système racinaire, ainsi que l'activité biologique et les processus physiologiques des plantes.

STYM ROOT revitalise, donne vigueur et énergie aux cultures, tout en agissant comme un complexe activateur du métabolisme enzymatique des plantes.

L'utilisation de **STYM ROOT** est particulièrement adaptée pour :



NON STYM ROOT

STYM ROOT

L'utilisation de la racine de souche est particulièrement adaptée pour :

Augmenter le développement du système racinaire au moment de la transplantation dans les premières phases de culture.

Stimuler la croissance et le développement général de la plante dans les premiers instants, ainsi que dans les situations de tout type de stress.

Facilite la synthèse des acides aminés et l'obtention de protéines, avec une économie d'énergie considérable.

Contribue aux cultures avec des unités fertilisantes essentielles à assimilation facile.

	DOSAGE DU SOL	Lts/ha
Horticole	3 à 5 applications après le semis ou le repiquage, pendant les premiers stades de la culture et tout au long du cycle	5-8
Fruits et agrumes	3 à 4 applications après la transplantation, pendant les premiers stades de la culture et pendant le cycle de culture.	6-10
Fraise	4 à 6 applications après la transplantation, pendant les premiers stades de la culture et pendant le cycle de culture.	6-8
	DOSAGE FOLIAIRE	
Horticole, vigne, melon, kiwi, agrumes, olivier, noisetier		200-250 ml/100L eau
Prairie	Dans des conditions de stress.	2-2,5 l/100L eau
	CULTURES EXTENSIVES DOSAGE FOLIAIRE	Lts/ha
Maïs	1- après le début de la végétation - développement des feuilles (BBCH 10-14)	1-1,5
Colza	1- après le début de la végétation - développement des feuilles (BBCH 10-14).	1-1,5
	2- la régénération du système racinaire après le début de la végétation printanière (BBCH 19/20)	1-1,5
Pomme de terre	1- développement des feuilles (BBCH 10-14)	1-1,5
Betterave à sucre	1- après le début de la végétation - développement des feuilles - stade jeunesse (BBCH 10-16)	1-1,5
	2- développement des feuilles - croissance de la rosette - couverture végétale (BBCH 18-33)	1-1,5
Blé	1- après le début de la végétation - développement des feuilles - 3 feuilles déployées (BBCH 10-13)	1-1,5
	2- la régénération du système racinaire après le début de la végétation printanière (BBCH 21/22)	1-1,5

STYM ROOT est compatible avec une grande partie des engrais phytosanitaires et foliaires, à l'exception des huiles minérales, des produits cupriques et organo-cupriques, du soufre ou de tout produit très alcalin. Il est toutefois nécessaire de réaliser un test préalable de compatibilité et de sélectivité des produits à appliquer.

EMBALLAGE :



IMPORTÉ
DE L'UE

WWW.ASPEAGRO.COM