

NOUVEAU
IMPORTÉ
D'ESPAGNE

Kalitat



PROMOTEUR DE COULEUR NATURELLE
ET DE MATURATION DES FRUITS

CARACTÉRISTIQUES

KALITAT est un produit spécialement conçu pour améliorer l'uniformité, la coloration, la consistance et la maturation des fruits. KALITAT est un produit qui inclut une forme spéciale dans la qualité et la production du fruit, en conséquence de ses composants biologiques actifs

KALITAT incorpore un polymère moléculaire organique de poids élevé, qui confère plus d'élasticité, d'hydratation et de fermeté à la peau des fruits. L'apport de calcium (Ca) et de magnésium (Mg), donne à KALITAT la capacité de réduire la perméabilité des membranes cellulaires et l'absorption d'eau, contribuant à augmenter la fermeté du fruit et, par conséquent, à prolonger sa durée de vie utile.

La formulation équilibrée de KALITAT, conçue avec une matrice organique riche en polysaccharides, macro et microéléments, éléments clés dans le processus de nouaison et de maturation des fruits, a été obtenue grâce à une sélection minutieuse de divers composants, préparés dans un équilibre optimal. Le résultat est un produit de la plus haute qualité et efficacité.

AMÉLIORE NATURELLEMENT LA COULEUR DES FRUITS

AUGMENTE LA TENEUR EN SUCRE DES FRUITS

AMÉLIORE LA FRUCTIFICATION ET PROLONGE LA VIE AUTONOME

AMÉLIORE LE CALIBRE ET LA FERMETÉ DU FRUIT

FAVORISER LA MURISSANCE DES FRUITS

COMPOSITION

%p/p

Azote total (N)	3,0
Potassium (K ₂ O)	5,0
Calcium (CaO)	5,0
Magnésium (MgO)	2,0
Polysaccharides	25,0
Acide uronique	2,0
Bore (B)	0,1
Zinc (Zn)	0,1



APPLICATION

FOLIAIRE

Culture	Application	Dose cc/l
Agrumes	Croissance des fruits	4
	Fin de la croissance	4-5
	Prématurité	4-5
Fleur coupée (CEILLET, LYS, GERBERA, ROSE)	À la différenciation des boutons floraux et avant la floraison.	2-2,5
Aubergine	De la croissance des baies tous les 10 à 15 jours.	3-4
Raisin	De la croissance des grains tous les 20-25 jours	3-4
Kiwi	Croissance des fruits Après le repos végétatif estival.	4 4 (2 applications)
Melon	À partir de la croissance des fruits (de la taille d'un œuf) tous les 10 à 15 jours	3-4
Piment	De la croissance des baies tous les 10 à 15 jours	3-4
Pomme	Croissance des fruits	4
	Fin de la croissance	4-5
	Prématurité	4-5

Culture	Application	Dose cc/l
Fruit à noyau	Croissance des fruits	4
	Fin de la croissance	4-5
	Prématurité	4-5
Fraises	Du blanchiment des fruits tous les 8 à 10 jours	3-4
Betterave à sucre	Stade 12-14 feuilles	3
	Deux semaines plus tard	3
Tomate	De la croissance des baies tous les 10 à 15 jours	3-4
Pastèque	À partir de la croissance des fruits (de la taille d'un œuf) tous les 10 à 15 jours	3-4
FERTIGATION		Dose
Horticulture	Au développement des fruits et tous les 10 à 15 jours	3-4 l/ha
Floriculture	Lors de la formation des boutons floraux.	4-7 l/ha

EMBALLAGE :



IMPORTÉ
DE L'UE