

BORON



CORRECTEUR DE CARENCE EN BORE

CARACTÉRISTIQUES

BORON est un correcteur liquide de carence en bore pour application foliaire ou au sol. Dans la betterave sucrière, il prévient les maladies cardiaques ou la putréfaction de la racine. Dans la pomme et la poire, **BORON** prévient les noyaux amers et les fissures. Dans le raisin, il prévient la formation de grappes, évitant les petits fruits ridés. Dans l'olivier, **BORON** prévient la perte de production et la déformation de l'olive. En horticulture, **BORON** prévient la pourriture du cœur du céleri, les feuilles enroulées du chou-fleur et du brocoli. Dans la laitue, il prévient la pourriture du cœur et la brûlure des côtés ; dans le haras, il prévient le dessèchement de la pointe et des tiges ; dans la pomme de terre, il évite la nécrose des tubercules présentant des déformations.

Les effets physiologiques les plus importants du bore dans les plantes sont :

Structure de la paroi cellulaire

Division cellulaire

Transport du sucre

Floraison et fructification

Régulation des hormones végétales

DOSAGE ET APPLICATION

Culture	Objectif	Recommandation
Dans toutes les cultures	Approvisionner avec du bore.	1-4 l/ha en application foliaire dans 200-400 l d'eau ou 5-8 l/ha en application au sol. Lors de l'application avec un pulvérisateur à dos à 0,5%.
Fruits à noyau	Germination du pollen, qualité des fleurs, nouaison des fruits, transport du calcium, qualité de la peau.	2-3 x 1 l/ha du bouton rouge jusqu'à la chute des pétales.
Pit fruit, Stone fruit, Strawberries, Berries, Table grapes	Stockage des substances de réserve, régénération, résistance au froid, qualité des fleurs.	2 x 1 l/ha après la récolte.
Fruits à noyau	Qualité de la fleur, nouaison des fruits.	1 l/ha début de floraison.
Raisins de table	Qualité de la fleur, nouaison, maturité régulière.	2 x 1 l/ha depuis la croissance de la grappe jusqu'au début de la floraison.
Fruits et légumes	Floraison, nouaison, apport en bore.	1-2 x 2 l/ha avant la floraison lorsque suffisamment de feuilles sont développées.
Crucifères, légumes à feuilles, légumes bulbeux	Qualité intérieure, contre la nécrose cardiaque du chou, apport de bore.	1-2 x 2-3 l/ha dès que suffisamment de feuilles sont développées.
Asperges, légumes racines, plantes tubéreuses	Qualité (fissures ; asperges ou tubercules vides ; échaudure intérieure), apport de bore.	1-2 x 3 l/ha dès que suffisamment de feuilles sont développées.
Céréales	Sortie, alimentation en bore.	0,5-1 l/ha jusqu'à la fin du tallage, une preuve de carence par analyse foliaire est fournie.
Pommes de terre	Qualité intérieure, apport en bore.	1-2 x 1 l/ha au croisement des rangs.
Maïs	Qualité du pollen, grainage, rendement en grains, densité énergétique, apport en bore.	3 l/ha à partir du stade 4 feuilles.
Colza	Résistance au froid, floraison et maturation régulières, rendement.	2-4 l/ha en automne du stade 4 au stade 6 feuilles.
	Floraison et maturité régulières, rendement, apport en bore.	2-4 l/ha au printemps jusqu'au début de la floraison
Betterave à sucre	Contre la pourriture du cœur et la pourriture sèche, rendement, qualité, apport en bore.	1-2 x 3 l/ha entre le stade 6 feuilles et la jonction des rangs.
Houblon	Développement du bourgeon et de la pousse, qualité.	3-5 x 0,1 % jusqu'à la floraison.

COMPOSITION

	%p/p	%p/v
Bore (B)	11,0	15,4

Densité : 1,35-1,40 @ 18°C



EMBALLAGE :



ENGRAIS
CE
IMPORTÉ
DE L'UE