



CARACTÉRISTIQUES

Solution de phosphite de potassium à 50%, sans chlorure. La présence de phosphore sous forme d'ion phosphite assure un effet prophylactique contre l'oomycose :

- **Gombose et hydrose des agrumes.**
- **Maladies de pourriture des racines. Pythium, Phytophthora.**
- **Mildius foliaire.**

En tant que source de PK, il doit être utilisé dans une phase de forte absorption de ces nutriments : formations du système racinaire, floraison et nouaison.

KELOM PHOS 30 20 Le phosphite génère des molécules défensives dans la plante. Phytoalexines et protéines PR qui attaquent le pathogène. Ces molécules défensives envoient des signaux d'alarme aux cellules qui n'ont pas encore été attaquées.

DOSE ET APPLICATION



APPLICATION FOLIAIRE

- Avocats, agrumes, vergers, jardins, plantes ornementales et pommes de terre : 200-300 cc/hl.
- Fraises et légumes : 250-350 cc/hl.
- Oliviers et vignes : 200-400 cc/hl.



FERTIRRIGATION:

- Avocat, agrumes, vergers, jardins, plantes ornementales, pommes de terre et arbres fruitiers : 6-15 L/ha. Après la récolte et avant la floraison pour les agrumes ; au printemps, début d'été et début d'automne, bien arroser et la jupe du tronc.
- Fraises et légumes : 4-10 L/ha tous les 20 jours.

INJURIES DESINFECTANT

Apply with a brush on the wound area a broth at a concentration of 350-700 cc / l (3.5-7 liters L/10).

Before preparing the final mixture, a compatibility test has to be done.

Do NOT mix directly with acid products of strong reaction, neither emulsifiable product with an alkaline reaction.

COMPOSITION

%p/p

Phosphore (P_2O_5)
Potassium (K_2O)

30
20

Densité 1,4 g/cc
pH (1% solution) 4 - 5



Meilleure floraison et fructification

Poids et taille des fruits plus importants

Augmentation de la qualité des fruits

CULTURES

AGRUMES

LÉGUMES

OLIVE

ORNAMENTALES

FRUITIERS

VIGNE

POMME DE TERRE

EMBALLAGE :

