



CARACTÉRISTIQUES

STYM ROOT SOLID est un biostimulant végétal qui favorise le développement et la croissance des racines, en applications foliaires et au sol directement dans les zones racinaires, son effet contribue à augmenter le flux de nutriments de la solution du sol vers la plante, en conférant aux plantes une plus grande résistance aux effets environnementaux défavorables.

STYM ROOT SOLID a une concentration élevée en phosphore (assimilation rapide) et des extraits organiques spécifiques inducteurs d'enracinement pour n'importe quelle étape de développement de la culture. **STYM ROOT SOLID** fournit les conditions et les éléments nécessaires au développement de la racine, augmentant sa croissance et obtenant une augmentation de la vigueur et de la résistance de la culture. Chaque molécule de **STYM ROOT SOLID** a une fonction spécifique dans la stimulation du développement du système racinaire. De plus, la composition de Stym root solid est dans un équilibre spécifiquement étudié pour favoriser le développement de la culture pendant les premières étapes.

Recommandé pour :

STYM ROOT SOLID est utilisé au début de l'activité de la plante pour stimuler la croissance des racines et favoriser l'activité de la plante dans les premiers stades ; en cas de stress, il active également la plante. Son utilisation est recommandée pour tous les types de cultures.

La relation entre le bon système racinaire et la formation adéquate des tissus vasculaires est directe et constitue ensemble l'une des bases les plus importantes pour atteindre un plus grand potentiel productif de la culture.

En plus de cela, c'est à la racine que la plupart des hormones responsables de la régulation du métabolisme de la plante sont synthétisées dans des processus importants comme la division cellulaire, l'épaississement et l'allongement ; la sénescence, la nouaison et la croissance des fruits, etc.

Principales actions de **STYM ROOT SOLID** :

Induction de la formation de poils absorbants racinaires.

Renforcement des racines, grâce à la participation de phosphore et de potassium de haute assimilation.

Augmenter sa croissance et obtenir une augmentation de la vigueur et de la résistance de la culture.

En situation de stress permet le renforcement de la zone racinaire nécessaire à la récupération et à la réactivation des cultures.

Augmente le nombre de cultures.

DOSES ET APPLICATION

COMPOSITION

%p/p

Azote (N) total	7,00
Phosphore (P ₂ O ₅)	35,0
Acides aminés libres	20,0
Acide indolbutylique (IBA)	1500 ppm
Acide naphtyacétique (ANA)	500 ppm



NON

STYM ROOT SOLID



ACIDES AMINÉS
SPÉCIFIQUES

INDUCTEUR BIO
D'ENRACINEMENT

MICRONUTRIMENTS
+ VITAMINES

AVEC

STYM ROOT SOLID

CULTURE	DOSAGE Kg/Ha	TEMPS D'APPLICATION
Substrat ou substrat pour plateauux	Dissoudre 125-250 g dans suffisamment d'eau pour humidifier 100 kg de substrat.	Utiliser le dosage faible à des températures inférieures à 20°C et le dosage élevé à des températures supérieures à 20°C
Lits et plateaux de péuriculture	100g pour 200L d'eau	Appliquer une fois par semaine, à partir de la troisième semaine de développement des semis.
APPLICATIONS SUR LE TERRAIN		
Transplanter	100g pour 100L d'eau	Appliquer au moment de la transplantation ou une semaine après l'application, 400 g pour 100 L d'eau, appliquer directement à la base de la plante.
Feuilles	0,5 à 1 kg/ha	Appliquer dans les deuxième et troisième semaines après la transplantation.
Irrigation goutte à goutte	2kg/Ha	Diluer le produit dans l'eau d'irrigation. Appliquer la 2e, 3e et 4e semaine après la transplantation.

STYM ROOT SOLID est appliqué par aspersion en solution dissoute dans la quantité d'eau indiquée dans la recommandation.

Dans le cas de jeunes plants récemment transplantés, il est conseillé d'appliquer **STYM ROOT SOLID** lorsque l'activité racinaire commence (1 à 5 jours après la transplantation), en faisant attention à ce que le produit reste profondément dans la racine. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de répéter le traitement une ou deux fois par semaine. Dans les cultures annuelles en cours d'établissement, nous suggérons d'appliquer **STYM ROOT SOLID** à un intervalle de 10 à 15 jours, de préférence pendant la saison de coupe. Dans le cas des plantes vivaces, l'appliquer au début du « développement racinaire » ou pendant la fructification. Pour un meilleur résultat, il est recommandé de répéter le traitement 2 ou 3 fois.

Il est recommandé de le mélanger avec des produits homologués dans les cultures autorisées, mais lors des tests de compatibilité, il est conseillé d'éviter de le mélanger avec des produits à base de calcium non chélatés.

EMBALLAGE :

