

NOUVEAU
IMPORTÉ
D'ESPAGNE



ACIDE FULVIQUE ET ACIDES AMINÉS

CARACTÉRISTIQUES

MOL AMYN est une croissance extrêmement bioactive favorisant et le sol agent améliorant sous forme liquide avec une forte concentration de acides fulviques et acides aminés naturels. **MOL AMYN** est 100% soluble dans l'eau et adapté à toutes les cultures de cultures feuillage et application du sol. Il peut être utilisé seul ou combinaison avec des engrais solubles et actuellement, la plante agents de protection.

MOL AMYN est un bio stimulant naturel et polyvalent. Il est produit par un procédé de fermentation bactérienne utilisant une plante crue. mol amyn contient un réseau complexe de sols à base de plantes les biostimulants, y compris les phytohormones naturelles (cytokinines, auxins gibberellins), polyamines, antioxydants, bétaines, peptides, métabolites secondaires, polysaccharides, auxines, vitamines, glucides et matières organiques pour améliorer les nutriments disponibilité dans le sol, entraînant une absorption élevée dans les plantes.

- BIODISPONIBILITÉ
- TRÈS SOLUBLE
- PETITE TAILLE DES PARTICULES
- STABILITÉ

ACTIONS

- ✓ CULTURE DE LA VIGUEUR OPTIMALE
- ✓ AUGMENTE LA TOLÉRANCE AU STRESS
- ✓ FAVORISE LA CROISSANCE DES RACINES
- ✓ AMÉLIORER L'ABSORPTION DES NUTRIMENTS ET TRANSPORT
- ✓ AUGMENTE LE NIVEAU MICROBIEN L'ACTIVITÉ DANS LE SOL
- ✓ RENDEMENT ET QUALITÉ

APPLICATIONS

Foliar: 200-300 mls/100 eau

Fertirrigation : Goutte à goutte : 5-10 L/ha

CULTURES	Saison et dosage annuel
Bleuets et de canneberges	10L/ha Appliquer 3 fois ; débourrement, nouaison et calibrage des fruits.
Céréales	Dose minimale : 4L/ha une fois. Peut être appliqué mélangé avec des herbicides. Dans céréales d'été, appliquer 35-40 jours après l'ensemencement.
Légumes fruitiers et fleurs coupées	4-6 applications dès le début de la culture, en fonction du stress et du développement.
Légumes en serre	Appliquer par le cycle de la culture tous les 7-14 jours; foliaire ou fertigate.
Vergers, Agrumes, Olives et olives, subtropicales	Appliquer et débourrer, pré-floraison et une fois la nouaison terminée. Utiliser lorsque les cultures sont stressées.
Légumes (melon, pastèque, laitue, etc.)	Plantes à feuilles : Appliquer régulièrement au début de la croissance.
Vins	Appliquer pendant la croissance végétative; répéter 2 à 3 fois à partir de l'ensemble de baies post jusqu'à ce que le début de la maturation.

COMPOSITION

%p/v

Acide humique	14,0%
Acides aminés libres	14,0%
Polysaccharides totaux	8,0%

Densité : 1,15 g/cc



TOUTES LES
CULTURES

FORCE
+
ÉNERGIE

EMBALLAGE :



IMPORTÉ
DE L'UE