

CARACTÉRISTIQUES

DOWN SAL a un effet de dessalinisation rapide et n'affecte pas la matière organique du sol. Il maintient le système d'irrigation propre, en augmentant la vitesse d'absorption de l'eau dans le sol, en l'élargissant et en libérant les nutriments.

DOWN SAL a une faible toxicité et est biodégradable.

DOWN SAL est une solution aqueuse d'acide polymaléique, si elle est intégrée au sol, elle solubilise le calcium, le magnésium et le sodium ; les deux premiers remplacent le sodium dans les mycéliums, en gardant le dernier en disposition de lessivage pour l'eau d'irrigation.

Avec **DOWN SAL** vous pouvez obtenir :

AVANTAGES

Accélère la lessivage des sels avec une réponse positive et immédiate de la culture.

Maintient la qualité du sol.

Facilite les tâches des cultures.

Plus grande assimilation par la plante.

Utilisation sûre et non polluante.

COMPOSITION

%p/p

Acide polymaléique

33,0

Densité : 1,1



Avec **DOWN SAL** vous pouvez obtenir :

- **La plus grande disponibilité de Ca dans la plante.**
- **Meilleures relations entre Ca/Mg et Ca/Na.**
- **Échange ionique de Sodium x Ca. Améliorant la structure et la capacité de drainage des sols.**



DOSES ET APPLICATIONS

Cultures	L/Ha	ml/100L	Détails
Luzerne	5 L/Ha		à la première irrigation et 2,5 L/Ha aux irrigations suivantes à chaque coupe.
Avocat, agrumes, arbres fruitiers à noyaux, arbres à graines, louquat et bananes	2-4 L/Ha		à la première irrigation de la saison précédant le débourrement et 1-2 L/Ha à chaque irrigation pendant la formation des fruits jusqu'à 8-16 L/Ha par an.
Coton	8 L/Ha		à l'irrigation précédant le semis ou 4 L/Ha à chacune des deux premières irrigations.
Herbe	5-10 L/Ha		à la première irrigation et 2,5 L/Ha aux irrigations successives.
Cucurbitacées, poivron et tomate	4-7 L/Ha		avant le semis ou le repiquage et 2,5 L/Ha à l'irrigation suivante.
Asperge	5-10 L/Ha		à la première irrigation et 2,5-5 L/Ha aux irrigations successives jusqu'à atteindre 10-14 chaque année.
Horticole et industriel	4-8 L/Ha		à la première irrigation de la saison et 1-2 L/Ha par semaine jusqu'à atteindre 8-16 chaque année
Fraises	8-16 L/Ha		chaque année
Artichaut, chou, laitue, betterave et carotte.	12-15 L/Ha		chaque année. Il est recommandé d'intégrer dans l'eau d'irrigation 200-400 cc/m ³

EMBALLAGE :

