

CHARACTERISTICS

KELOM Ca Mg Aa est un engrais fluide en émulsion totalement hydrosoluble qui permet une absorption immédiate et équilibrée du calcium et du magnésium, même dans des conditions de déséquilibre hydrique et de stress environnemental. Il est très efficace à n'importe quel stade du cycle de culture par application foliaire. La présence d'acides aminés est utile à la plante au stade de grossissement des fruits.

KELOM Ca Mg Aa dans les fruits prévient et guérit les physiopathologies telles que le bitter pit chez les pommiers et le dessèchement du rachis chez les raisins. En horticulture prévient et guérit les physiopathologies causées par les carences en calcium et magnésium : floraison et pourriture chez la tomate et le poivron, dessèchement du pétiole, du bord de la feuille chez le melon, de la pointe du collet chez la salade. En floriculture, il augmente la croissance et la couleur des feuilles et des fleurs et prévient les taches foliaires.

LA COMBINAISON DES ÉLÉMENTS COMPOSANTS :

- Augmente la teneur en sucre des fruits.
- Améliore la fermeté, la couleur et la peau des fruits.
- Prévient et guérit les physiopathologies causées par les carences en Ca et Mg.
- Augmente la résistance aux fissures et au brunissement des fruits.
- Prolonge la durée de conservation et la capacité de stockage.

COMPOSITION

%p/v

Calcium (CaO)	24,00
Magnésium (MgO)	3,00
Fer (Fe)	0,075
Manganèse (Mn)	0,15
Cuivre (Cu)	0,06
Zinc (Zn)	0,03
Bore (B)	0,075
Molybdène (Mo)	0,0015
Acides aminés	10,00

Densité	1,5
pH (10% solution)	5,5-6



DOSAGE ET APPLICATION

CULTURE	CONTRÔLEUR DES CONDITIONS	TAUX L/Ha	TAUX ml/100L	DÉTAILS DES CANDIDATURES
Pommes	Fosse amère	2,0 - 3,0	200 - 300	5 à 7 applications dès les premiers signes de croissance. Combiner avec des pulvérisations de couverture.
Avocats	Tache pulpaire	4,0 - 8,5	400 - 850	Applications multiples.
Brocoli	Tête brune.	2,0 - 3,0	200 - 300	4 à 6 applications commençant peu avant la formation de la tête.
Choux de Bruxelles	Brunissement interne.	4,0 - 6,0	400 - 600	Applications multiples.
Chou, chou-fleur, laitue, endive	Brûlure de la pointe.	2,0 - 4,0	200 - 400	4 à 6 applications commençant peu avant la formation de la tête.
Céleri, Chicorée	Coeur noir.	3,5 - 5,0	350 - 500	Applications hebdomadaires commençant peu avant l'apparition des symptômes du cœur noir.
Cerises, Prunes	Fissuration	3,5 - 6,0	350 - 600	3 à 4 applications à partir de 6 à 8 semaines avant la récolte.
Coton	Perte de cheveux carrée	4,0	400	3 applications entre le stade 5 - 7 feuilles et la floraison.
Concombres, melons, poivrons, tomates	Pourriture apicale	1,5 - 3,5	150 - 350	6 à 12 applications en période de stress thermique.
Raisins	Réduction du dépérissement des tiges et de la rarefaction des baies	3,0 - 6,0	300 - 600	3 à 4 applications du début du ramollissement des baies jusqu'à leur maturité.
Kiwi	Pourriture apicale	4,0 - 8,5	400 - 850	Applications multiples.
Plantes ornementales	Durée de vie du vase améliorée	2,5	250	Applications hebdomadaires.
Pêches, Nectarines	Amélioration de la fermeté des fruits	3,5 - 5,0	350 - 500	4 à 5 traitements dès la nouaison.
Pomme de terre	Tache brune interne	2,5 - 5,0	250 - 500	Applications multiples en période de stress thermique.
Poires	Brûlure superficielle	4,0 - 6,0	400 - 600	Applications multiples.
Fraises et autres baies	Augmentation de la fermeté des fruits	6,0	600	3 applications en conjonction avec les dernières pulvérisations de pesticides avant la récolte.

EMBALLAGE :

