

CARACTÉRISTIQUES

COLOR K NEUTRAL est un engrais potassique à pH neutre. Entièrement miscible à l'eau, il est assimilable par voie foliaire ou racinaire.

Le potassium de COLOR K NEUTRAL est complexé par l'acétate et le formiate, ce qui facilite son absorption et son transport par le phloème, jusqu'aux tissus du fruit et du reste de la plante, là où cet élément est nécessaire. Les besoins en potassium sont les plus importants lors du développement, de la croissance et de la maturation des fruits, des racines et des tubercules.

AMÉLIORATION DE LA TAILLE ET DE LA COULEUR

FAVORISE LA MATURATION ET LA CROISSANCE DES FRUITS

APPLIQUÉ AUX FRAISES, AMÉLIORE LA TENEUR EN SUCRE

APPLICATION

CULTURE	OBJECTIF	TEMPS D'APP	N°APPS	DOSE
AGRUMES (Orange / Mandarine)	- Améliorer la couleur extérieure. - Augmenter la teneur en sucre. - Améliorer la taille des fruits.	6 à 8 semaines avant la récolte. - Début du changement de couleur.	2 - 3	Fertigation: 10–15 L/ha Foliaire: 300-600 cc/100L
COTON		2 à 4 applications tout au long du cycle de culture.		Fertigation: 15-40 L/ha Foliaire: 300-600 cc/100L
FRUIT		Au cours de la nouaison, du grossissement des fruits et avant la récolte.		Fertigation: 15-40 L/ha Foliaire: 300-600 cc/100L
HORTICULTURAL		2 à 6 applications pendant le cycle de culture.		Fertigation: 15-40 L/ha Foliaire: 300-600 cc/100L
OLIVE		Au cours de la nouaison, du grossissement des fruits et avant la récolte.		Fertigation: 15-40 L/ha Foliaire: 300-600 cc/100L
OIGNON	- Augmentation du volume du bulbe. - Amélioration de la fermeté. - Mieux capacité de conservation.	Début de la formation du bulbe	2 - 3	Fertigation: 6–10 L/ha
ORNAMENTAL		2 à 4 applications pendant le cycle de culture.		Fertigation: 15-40 L/ha Foliaire: 300-600 cc/100L
POMME DE TERRE	- Calibre des tubercules amélioré. - Teneur en matière sèche plus élevée. - Mieux conservation après récolte.	- Début de la tubérisation. - Stade de développement des tubercules.	2 - 3	Fertigation: 8–12 L/ha

COMPOSITION

Potassium (K₂O)

Densité : 1,35

pH: 7,5

%p/v

33,75



CULTURE	OBJECTIF	TEMPS D'APP	N°APPS	DOSE
BETTERAVE A SUCRE		Commencer 2 mois avant la récolte.		Fertigation: 15-40 L/ha Foliaire: 300-600 cc/100L
FRAISES	- Concentration en sucre plus élevée. - Fermeté améliorée. - Couleur plus intense.	- Début de la floraison. - Phase de développement et de remplissage des fruits.	4 à 6 applications (pendant la période de production)	Fertigation: 4–8 L/ha Foliaire: 2–3 L/ha
RAISINS DE TABLE	- Coloration améliorée (surtout pour les variétés rouges). - Teneur en sucre accrue. - Grossesse des baies.	- Dès la nouaison. - Surtout à la véraison.	2 - 4	Fertigation: 8–12 L/ha Foliaire: 3 L/ha
TOMATE	- Amélioration de la couleur rouge. - Mûrissement uniforme.	- Dès le début de la formation du fruit. - Jusqu'à 10 à 14 jours avant la récolte.	3–5	Fertigation: 5–10 L/ha per application Foliaire: 2–3 L/ha
FRUITS TROPICAUX		2 à 4 applications pendant le cycle de culture.		Fertigation: 15-40 L/ha Foliaire: 300-600 cc/100L
PASTÈQUE ET MELON	- Plus sucré. - Fermeté améliorée. - Hygiène des fruits.	- Début de la croissance du fruit. - Jusqu'à la pré-récolte.	2 - 3	Fertigation: 6–10 L/ha Foliaire: 2–3 L/ha
VIGNE		Au moment de la croissance, de la maturation et de la coloration des fruits.		Fertigation: 15-40 L/ha Foliaire: 300-600 cc/100L

EMBALLAGE :



ENGRAIS
CE
IMPORTÉ
DE L'UE