

CARACTÉRISTIQUES

STOP Ca B est une formulation solide contenant du Calcium sous forme de N.O.C. (Complexant Organique Naturel) et du Bore comme nutriment synergique. Le Bore favorise la mobilité du Calcium à travers la plante, atteignant les fruits.

Il se fixe rapidement dans les tissus végétaux et est donc particulièrement utile pour produire des fruits et des baies plus résistants aux physiopathies et aux coups pendant la récolte, pour améliorer leur conservation et pour réduire la fissuration (ou l'éclatement) des fruits. Appliqué juste après la nouaison, il stimule la division cellulaire et augmente la taille des fruits.

STOP Ca B confère une plus grande résistance à la salinité, à la sécheresse (réduisant la chute des fleurs, des feuilles, des fruits) et aux gelées tardives à tout type de plantes.

C CALCIUM

- Impliqué dans l'activation des enzymes en tant que cofacteur.
- Contrôle la maturation des fruits.
- Participe à la sélectivité de la membrane végétale.
- Impliqué dans la division cellulaire et l'élongation cellulaire.

B BORE

- Essentiel à la division cellulaire et au développement du méristème.
- Contrôle le mouvement des sucres, des amidons et des acides aminés.
- Il est étroitement lié au calcium pour empêcher la chute des fleurs et des fruits.
- Impliqué dans la maturation des fruits.

DURETÉ ET CONSISTANCE DES FRUITS

DOSAGE ET UTILISATION

CULTURES	Fertigation Kg/ha	Pulvérisation foliaire gr/100 l eau	APPLICATION
FLEURS ET PLANTES ORNEMENTALES	2 - 4	100 - 200	Avant la floraison
HORTICULTURE	4 - 8	100 - 150	Après la nouaison, tous les 15 à 25 jours.
NURSERY	2 - 3	200 - 300	En cas de condition de stress. ^o
CULTURES INDUSTRIELLES		150 - 250	Chez les céréales, formulation de la panicule, généralement avant la floraison.
VERGERS, VIGNOBLES, AGRUMES		250 - 500	Après la nouaison, tout au long de la saison tous les 15 jours.

the dose refers to a volume of water of 10 hl/ha

COMPATIBILITÉ

Bonne compatibilité avec tous les produits phytosanitaires, à l'exception des produits contenant un pourcentage élevé de phosphore et de soufre.

COMPOSITION

%p/p

Calcium (CaO)	34,0
Boron (B)	2,0
N.O.C. (Natural Organic Complexant)	64,0
pH (watery solution 1%)	7 ± 0,5



CONCENTRATION
ÉLEVÉE EN
CALCIUM

AVANTAGES

- EFFICACE DANS LE TRAITEMENT DU BITTER POT SUR LES POMMIERS.
- RÉSOUT LE PROBLÈME DE LA POURRITURE APICALE CHEZ LES TOMATES ET DES TACHES FOLIAIRES CHEZ LES POIVRONS.
- SOIGNER LE DESSÈCHEMENT DES FEUILLES DE MELON ET LA BRÛLURE DES POINTES CHEZ LA LAITUE, L'ENDIVE ET LA SCAROLE.
- EFFICACE CONTRE LES FISSURES DES FRUITS À NOYAU.

EMBALLAGE :

1 Kg

5 Kg

20 Kg