

KELOM MIX SOLID est un composé solide, hautement soluble dans tous les types d'eau et dont les micronutriments Fer, Manganèse, Cuivre, Zinc, Bore, Molybdène et Magnésium contribuent simultanément à la plante en fournissant le dosage nécessaire de nutriments indispensables au parfait développement de toute culture.



COMPOSITION

%p/p

Bore (B)	1,5
Cuivre (Cu) chélaté avec EDTA	0,6
Fer (Fe) chélaté avec EDTA	4,00
Manganèse (Mn) chélaté avec EDTA	3,00
Molybdène (Mo)	0,05
Zinc (Zn) chélaté avec EDTA	4,00

CARACTÉRISTIQUES

À l'exception du bore et du molybdène, les autres nutriments contenus dans **KELOM MIX SOLID** sont inclus dans une molécule (EDTA, acide éthylènediaminetétraacétique) qui les protège dans le sol et, une fois appliqué sur les feuilles, facilite leur absorption et leur transport vers la plante.

Son procédé de fabrication unique obtenu par mélange chimique en phase liquide assure une chélation complète et une homogénéité totale ; en conservant la même composition, la même taille, la même densité, la même couleur et l'équilibre nutritionnel garanti dans chaque microgranule.

KELOM MIX SOLID permet un dosage facile et correct qui offre une solubilité instantanée et une efficacité agronomique élevée ; obtenant de bons rendements et des récoltes de haute qualité.

CULTURE	TAUX	APP.	COMMENTAIRES CRITIQUES
Céréales, Légumineuses à grains, Oléagineux, Coton, Maïs, Cultures d'été	1-1.5 kg/ha	Foliar	Appliquer en début de saison, au tallage et à la montaison.
Pâturages, luzerne et cultures fourragères	1-2 kg/ha	Foliar	Appliquer après chaque pâturage ou coupe.
Pommes de terre et autres tubercules	1kg/ha	Foliar	Appliquer jusqu'à 4 applications à partir du stade 10 cm jusqu'à la post-floraison, à des intervalles de 7 à 10 jours. Appliquer dans un minimum de 500 L/ha d'eau.
Légumes	0.5-1 kg/ha	Foliar	Appliquer jusqu'à 3 applications à 10-15 jours d'intervalle lorsqu'il y a suffisamment de feuillage. Appliquer dans un minimum de 500 L/ha d'eau.
	5-10 kg/ha	Soil	Appliquer avant le semis, le repiquage ou le début de la croissance des plantes.
	2-3 kg/ha	Fertigation	Appliquer tous les 7 à 10 jours pendant le cycle de culture.
	2-3 kg/1000L	Hydroponics	Appliquer selon les besoins : 1 L de solution préparée pour 100 L d'eau d'irrigation. Utiliser la dose la plus élevée pendant le développement des cultures ou les périodes de température élevée ou pendant les journées plus courtes et plus fraîches.
La vigne (vin et table)	100 g/100L or 0.5-1.0 kg/ha	Foliar	Appliquer 2 à 3 fois au cours du cycle de culture. Appliquer uniquement par dilution. Ne pas dépasser le taux maximum par hectare. Taux d'arrosage minimum de 500 L par ha.
	2-3 kg/ha	Fertigation	Appliquer tous les 7 à 10 jours pendant le cycle de culture.
Pommes, poires, fruits à coque, agrumes, mangues, fruits à noyau, avocats, ananas,	50 g/100L or 0.5-1.0 kg/ha	Foliar	Appliquer 2 à 3 fois au cours du cycle de culture. Appliquer uniquement par dilution. Ne pas dépasser la dose maximale par hectare. Débit d'eau minimum de 500 L par ha.
	2-3 kg/ha	Fertigation	Appliquer tous les 7 à 10 jours pendant le cycle de culture.
Olives	0.5-1.5 kg/ha	Foliar	Appliquer lorsque le feuillage est suffisant. Appliquer dans un minimum de 500 L/ha d'eau.
	5-10 kg/ha	Soil	Appliquer avant le semis, le repiquage ou le début de la croissance des plantes.
Fraises, autres cultures de baies	2-3 kg/ha	Fertigation	Appliquer tous les 7 à 10 jours pendant le cycle de culture.
	2-3 kg/1000L	Hydroponics	Appliquer selon les besoins : 1 L de solution préparée pour 100 L d'eau d'irrigation. Utiliser la dose la plus élevée pendant le développement des cultures ou les périodes de température élevée ou pendant les journées plus courtes et plus fraîches.

EMBALLAGE :

