

GROWTH MIX



RÉGULATEUR DE CROISSANCE DES PLANTES

CARACTÉRISTIQUES

GROWTH MIX est un régulateur de croissance équilibré pour les plantes, composé de nutriments, d'acides aminés et d'acides fulviques, tous d'une grande importance et qui ont un impact sur les processus physiologiques et métaboliques des plantes.

Tous les composants de **GROWTH MIX** sont assimilables par les feuilles et les autres organes de la plante.

L'équilibre entre les concentrations d'auxines, de gibbérellines et de cytokines dans **GROWTH MIX** permet d'avoir un apport significatif de ces composés à la plante sans provoquer de déséquilibre hormonal.

Excellente floraison et nouaison

COMPOSITION

	%p/v
Gibbérellines 500 ppm	Calcium (Ca) 0,8
Auxines 500 ppm	Zinc (Zn) 2,0
Cytokinines 200 ppm	Acide fulvique 25,0
Cisteine 500 ppm	Azote (N) 9,0
Tiamine 1110 ppm	
Inositol 200 ppm	



DOSAGE ET APPLICATION

Blé, épinard et laitue à feuilles ouvertes : Appliquer 0,75 à 1 L/Ha de 3 à 4 semaines après la levée.

Coton : Appliquer 0,75 à 1 L/Ha au moment du premier ou du deuxième carré. Appliquer principalement sur les variétés de taille moyenne et basse ou pour sortir d'un stade de stress.

Ail et oignons : Appliquer 0,75 à 1 L/Ha dans les moments précédant la différenciation des bulbes (10-12 semaines après la plantation).

Luzeur : Appliquer 0,75 à 1 L/Ha après chaque coupe lorsque la repousse apparaît.

Céleri : Appliquer 0,75 à 1 L/Ha de 4 à 6 semaines avant la coupe.

Brocoli, chou-fleur, chou et laitue : Appliquer 0,75 à 1 L/Ha au début de la formation de la tête (inflorescence).

Chou vert et poireau : Appliquer 0,75 à 1 L/Ha 30 jours après la transplantation pour le poireau et 45 jours après la plantation pour l'oignon, à renouveler 30 jours plus tard.

Cucurbitacées (concombre, melon et pastèque) : Appliquer 0,75 à 1 L/Ha lorsque les plantes ont 3 à 5 vraies feuilles. Répéter au début de la formation des cives, continuer tous les 15 jours jusqu'à la dernière coupe.

Céréales (blé, orge, avoine, triticale) : Appliquer 0,75 à 1 L/Ha au stade de plein tallage, début de formation de la tige et stade de la botte.

Melon : Dans les plantations de 1 ou 2 ans, appliquer 0,75 à 1 L/Ha pendant le cycle. En culture 3 ans de plus, 2 applications à 30 jours d'intervalle entre chaque. La première lorsque la plante mesure 30 cm de hauteur et la seconde 50 cm de hauteur.

Fleurs : Appliquer 0,75 à 1 L/Ha au moment de l'apparition des tiges florales.

Haricots, haricots verts, soja : Appliquer 0,75 à 1 L/Ha au moment de l'apparition des boutons floraux et répéter 1 à 3 fois tous les 15 jours.

Maïs et sorgho : Appliquer 0,75 à 1 L/Ha entre 6 et 8 feuilles complètement développées, et si possible répéter en pleine floraison.

Pomme de terre : Appliquer 0,75 à 1 L/Ha au moment de l'initiation du tubérisation et répéter 15 à 30 jours plus tard.

Tomate, poivron et aubergine : Appliquer 0,75 à 1 L/Ha à l'apparition des fleurs, répéter toutes les 2 ou 3 semaines jusqu'à la dernière floraison commerciale.

Tabac : Appliquer 0,75 à 1 L/Ha 30 jours après le repiquage et répéter 30 jours plus tard.

Agrumes, avocat, mangue, papaye et goyave : Appliquer 150 à 200 ml pour 100 L d'eau jusqu'à l'apparition des fleurs remontantes 30 jours.

Pommier et pêcher : Appliquer 150 à 200 ml pour 100 L d'eau pour les pointes argentées (pommier) et les pointes vertes (pêcher) et répéter lorsque le fruit a 1 à 2 cm de diamètre.

Fraisier : Appliquer 0,75 à 1 L/Ha une fois par mois, à partir du moment de l'apparition de la première grappe de fleurs.

EMBALLAGE :

