

CARACTÉRISTIQUES

Les composants de **KELOM COTTON** mobilisent les particularités processus végétal d'adaptation à un stress particulier conditions, en augmentant et en maintenant les capacité de rétention des fleurs et des petits fruits dans le positions et branches les plus avantageuses, pour maximiser la production et la précocité de la récolte.

KELOM COTTON est constitué d'enzymes et de croissance substances d'origine naturelle par un procédure d'extraction fermentaire de les algues, afin de stabiliser et d'équilibrer son composition, il contient des acides organiques (acides polyhydroxi-carboxyliques) et chélatés micronutriments pour éliminer les limitations de rendement facteurs. On sait que les micronutriments participent à enzymes essentielles nécessaires pour compenser la perte d'énergie cellulaire. La préparation est terminée avec un activateur métabolique

- **MAXIMISE LA PRODUCTION DE COTON**
- **AUGMENTER LA RÉTENTION ET LA QUALITÉ DE LA CAPSULE**
- **PRÉCOCITÉ**

APPLICATIONS ET DOSAGES

AJOUT	STADE PHÉNOLOGIQUE	DOSAGE
1ère	Début de floraison	1,0 L/Ha
2ième	40-45 jours après le premier ajout	0,75 L/Ha

COMPOSITION

	%p/p
Acides polyhydroxycarboxyliques (PHCA)	25,0
Acides aminés totaux	15,0
Bétaïne	9,0
Azote (N) Organique	2,0
Fer (Fe)	1,68
Manganèse (Mn)	0,63
Zinc (Zn)	0,34
Cuivre (Cu)	0,04
Bore (B)	0,34
Molybdenum (Mo)	0,004



UNE CROISSANCE ET UN RENDEMENT PLUS ÉLEVÉS DANS LA CULTURE DU COTON EST OBTENU AVEC LE COTON KELOM

1ÈRE AJOUT

Augmente le nombre de branches fructueuses et de positions en leur sein.

Délivrance de toutes les fructifications possibles.

2IÈME AJOUT

Rétention d'environ 60% des fructifications.

Développement équilibré et maintien de l'émission de ces organes.

Formation et maturation des fruits.

Précocité de la récolte et plus grand nombre de capsules récoltables en 1ère récolte.

PACKING:

