



CARACTÉRISTIQUES

ALGEX est un stimulant naturel qui intensifie le métabolisme végétal et améliore le rendement des cultures.

ALGEX est un phytofortifiant adapté à tous types de cultures, notamment les agrumes, les fraisiers, les arbres fruitiers, les oliviers, les plantes ornementales et les vignes. Son utilisation est recommandée lors des phases de forte activité végétative (repiquage, floraison, nouaison et croissance des fruits) ou en cas de conditions défavorables (gel, sécheresse, grêle, ravageurs, maladies, etc.).

EFFETS DES ALGUES SUR LES PLANTES

TOLÉRANCE AU STRESS ABIOT

- 1- Tolérance à la salinité et à la sécheresse
- 2- Tolérance au gel
- 3- Résistance aux températures élevées, aux inondations et à la pollution

APRÈS LA RÉCOLTE

- 1-Durée de conservation améliorée
- 2-Qualité de stockage améliorée
- 3-Valeur nutritionnelle améliorée

RÉPONSE DE CROISSANCE

- 1- Croissance améliorée des pousses et des racines
- 2- Floraison et fructification accrues
- 3- Meilleur rendement

RÉSISTANCE AU STRESS BIOTIQUE

- 1-Résistance aux champignons
- 2-Résistance aux insectes ravageurs.

COMPOSITION

%p/p

Ascophyllum nodosum (extrait d'algue)	30,00
Acide alginique	4,80
Manitol	1,40
Azote	5,00
Potassium (K ₂ O)	5,50



DOSES ET APPLICATIONS

CULTURES	Application foliaire (L/ha)	Fertirrigation (L/ha)	Nombre d'applications	Intervalle entre les applications
Baies	1 - 2	2 - 3	2 - 5	7-10 days
Agrumes	2 - 3	3 - 5	2 - 4	10 - 15 days
Cultures extensives (céréales, légumineuses...)	0,75 - 1	1 - 2	1 - 2	15 - 30 days
Arbres fruitiers	1,5 - 2	2 - 2,5	2 - 3	10 - 15 days
Horticulture (Serre)	1 - 2	2 - 3	2 - 5	7-10 days
Horticulture (champ ouvert)	0,75-1	1 - 2	1 - 2	15-30 days
Olivier et vignoble	1-1,5	2 - 2,5	1 - 3	15 days
Raisin de table	1 - 2	2 - 3	2 - 4	10-15 days
Arbres fruitiers tropicaux et subtropicaux	1 - 1,5	2 - 2,5	2 - 3	10-15 days
Tubercules (pomme de terre, patate douce...)	1 - 1,5	2 - 2,5	1-2	15 days

COMPATIBILITÉ :

Bonne compatibilité avec tous les produits phytosanitaires. Avec les produits à base d'oligo-éléments, réduire la dose et effectuer un test préalable.

Agiter avant l'utilisation

EMBALLAGE :

