

NOUVEAU
IMPORTÉ
D'ESPAGNE

n-45

NANO COMPLEX



AZOTE NANO DE HAUTE TECHNOLOGIE

CARACTÉRISTIQUES

N-45 NANO COMPLEX est un produit nutritionnel formulé et non un simple mélange de matières premières, comme c'est le cas pour la plupart des engrais NPK en poudre.

1 Absorption immédiate de l'azote (FOLIAIRE)



2 Toutes les formes d'azote + oligo-éléments



3 Plus de kilogrammes produits par unité



COMPOSITION

%p/v

Azote total (N)	45,00
Zinc EDTA	01,00
Manganèse EDTA	00,80
Molybdène	00,05
Nickel	00,02



PRINCIPAUX AVANTAGES

- Alternative à l'urée
- Formation d'un film protecteur
- Gel pour un meilleur contact foliaire
- Réduit la salinisation des sols

DOSAGE ET APPLICATION



CULTURE	L/Ha	ml/100L	DÉTAILS D'APPLICATION
 RIZ	2 - 5	200-300	Du stade d'enracinement au tallage. Pulvériser 2 à 3 fois par cycle cultural.
 MAÏS	4 - 5	100 - 300	Une semaine après la germination. Pulvériser 3 à 4 fois par cycle.
 COTON	—	200 - 300	2 à 3 applications (du stade 4 feuilles jusqu'à la récolte).
 AGRUMES	4 - 5	200 - 300	3 à 4 applications (débourrement, préfloraison, nouaison et grossissement).
 ARBRES FRUITIERS ET VIGNE	3 - 5	200 - 300	2 à 4 applications (du débourrement jusqu'à la différenciation des bourgeons).
 CÉRÉALES	4 - 5	100 - 300	1 à 2 applications.
 CULTURES MARAÎCHÈRES	4 - 6	200 - 300	3 à 4 applications tous les 10 à 14 jours.

CULTURE	L/Ha	ml/100L	DÉTAILS D'APPLICATION
 BETTERAVE À SUCRE	4 - 6	200 - 300	2 à 3 applications.
 OLIVIERS	5 - 10	300 - 400	3 applications (début du débourrement, durcissement du noyau et grossissement des fruits).
 POMME DE TERRE	5 - 10	300 - 400	1 à 2 applications au début de la culture.
 MANGO	3 - 5	200 - 300	Appliquer pendant la phase de croissance et durant l'intersaison.
 OIGNONS / AIL	4 - 6	100 - 200	De 7 à 10 jours après le repiquage jusqu'à la formation du bulbe. Pulvériser 3 à 4 fois par cycle cultural.
 CULTURES DE PLANTATION (BANANE, ANANAS)	3 - 5	200 - 300	Du stade végétatif jusqu'à la préfloraison.

EMBALLAGE :



ENGRAIS
CE
IMPORTÉ
DE L'UE